

Valutazione dell'impianto di prescrizione dell'infermiera

Roxane Borgès Da Silva

Isabelle Brault

Carl-Ardy Dubois

Aude Motulsky

Alexandre Prud'homme



INSTITUT DE RECHERCHE
EN SANTÉ PUBLIQUE

Fonds de recherche
Santé

Québec



Faculté des sciences infirmières

Université 
de Montréal et du monde.

Mappa della presentazione

- Contesto
- Obiettivi
- Alcuni elementi di metodi
- Risultati
- Conclusione

Contesto

- Salute della popolazione: invecchiamento e malattie croniche
- Servizi sanitari in Quebec
- Soluzioni per migliorare le prestazioni del servizio sanitario
- Condivisione di attività tra operatori sanitari e mix di competenze
 - Uso efficiente di ogni professionista sanitario: massimizzare l'ambito di pratica degli infermieri
 - La cura infermieristica per le malattie croniche stabili sembra essere simile alla cura medica

Efficiency in primary healthcare is an essential condition for chronic diseases follow-up (Bodenheimer, 2002 ; Starfield, 2005)

Infermiera prescrizione

- Le infermiere sono autorizzate a prescrivere in diversi paesi: Australia, Finlandia, Irlanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Sudafrica, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito, USA
- **2013:** ampia consultazione con la popolazione e infermieri da parte dell'OIIQ: soluzioni per migliorare l'accessibilità e la continuità dei servizi sanitari.
- Infermieri:
 - le loro competenze sono inutilizzate
 - La fornitura di servizi infermieristici dovrebbe essere estesa
- Popolazione:
 - Grande fiducia nell'infermiere
- **2013-2015:** Negoziazione tra OIIQ e CMQ per estendere le responsabilità degli infermieri e dare loro il diritto di prescrivere in determinate situazioni
- **11 gennaio 2016:** Adozione del regolamento che autorizza gli infermieri a prescrivere

Il regolamento sulla prescrizione infermieristica

- Entrata in vigore: 11 gennaio 2016
- Regolamento che consente alle infermiere di prescrivere nelle seguenti situazioni cliniche:
 - Cura della ferita
 - Salute pubblica
 - Problemi comuni di salute
- Zone cliniche mirate:
 - Salute della comunità (CLSC, GMF, emergenza, clinica giovanile, ecc.)
 - assistenza a lungo termine (CHSLD, residenza PA)
 - Unità ospedaliera (assistenza intensiva, chirurgia specializzata)

Contesto

Numero di certificati rilasciati all'inizio dell'indagine

- Numero di certificati emessi sotto le aspettative ($n = 3.047$)¹
- (obiettivo per raggiungere ≈ 10.000 infermieri)¹
- Delle infermiere che hanno ottenuto il certificato di prescrizione, 229 avrebbero eseguito almeno 1 prescrizione²

¹ OIIQ. Décembre 2017.

² Radio-Canada. 3 juillet 2016. <http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/793715/infirmieres-cliniciennes-oiq-prescriptions>

Obiettivi

- Obiettivo principale: valutare l'innesto delle prescrizioni infermieristiche, facilitare e limitare i fattori
- Obiettivi specifici:
 1. Individuare i fattori che hanno influenzato la scelta degli infermieri per richiedere o no la prescrizione
 2. Determinare il livello di utilizzo del diritto di prescrizione
 3. Individuare i fattori che influenzano l'uso del diritto di prescrizione

Metodo

Strumenti di raccolta

- Sviluppo di un questionario per infermieri
 - Pochi studi sull'argomento
 - Ispirato al questionario convalidato ed elaborato da Latter et al. (Università di Southampton)
 - Adattato al contesto del Québec e per soddisfare i nostri obiettivi specifici
 - Questionario co-costruito con i ricercatori e l'OIIQ

Metodo

Raccolta e analisi dei dati

- Indagine di infermieri
 - Sondaggio online (indagine di calendario)
 - Inviti di posta elettronica (OIIQ): 39.757 infermieri che lavorano in una delle impostazioni cliniche
 - Dati raccolti tra il 25 gennaio e il 9 marzo 2017
 - Due promemoria di posta elettronica (OIIQ) per completare il questionario
 - Numero degli intervistati: 2010
- Convalida dei dati
- Ponderazione dei dati (per assicurare che il campione sia rappresentativo di tutti gli infermieri che lavorano nelle impostazioni di regolamento)
- Statistiche descrittive (test chi al quadrato per misurare l'associazione tra variabili)


RISULTATI




INSTITUT DE RECHERCHE
EN SANTÉ PUBLIQUE

Université 
de Montréal


Tasso di rispondenza dell'indagine




Tasso di risposta all'indagine a seconda che sia stato ottenuto o meno il certificato di prescrizione




Infermiere per stato e età




Proporzione di infermieri che riferiscono prescrizione, da parte del posto di lavoro




Infermiere per stato e conseguimento di almeno una prescrizione




Tasso di infermieri che afferma che almeno un attore si è impegnato a fornire loro consigli nel caso in cui desiderino ottenere la prescrizione dallo statuto




Tasso di infermieri che afferma che almeno un attore si è impegnato a pagare per la formazione on-line in caso di desiderio di ottenere la prescrizione dallo statuto




Supporto promesso e sostegno reale per pagare i costi di formazione




Livello generale di incoraggiamento a richiedere l'attestazione di prescrizione ricevuta secondo lo statuto




Percezione della procedura per l'ottenimento del certificato di prescrizione secondo lo statuto




Infermieri senza attestazione: motivi di non attestazione




Infermiere con attestato: motivi per ottenere il certificato



Numero medio delle prescrizioni eseguite in un periodo di 30 giorni dal luogo di lavoro




Infermiere che hanno almeno una prescrizione secondo la categoria




Ostacoli all'uso del diritto di prescrizione

■ Mai ■ A volte ■ Spesso ■ Molto spesso




Il 60% degli infermieri con il certificato di prescrizione afferma di avere sperimentato **almeno una situazione** in cui avrebbero potuto eseguire una prescrizione senza averlo fatto


Motivi di ostacoli al non utilizzo del diritto di prescrizione




Infermieri che hanno paura delle tensioni con uno dei seguenti attori in relazione alle sue attività di prescrizione



Infermieri che affermano di aver subito delle tensioni con uno dei seguenti attori in relazione alle sue attività di prescrizione



Infermiere secondo il loro livello di fiducia quando si prescrive



Conclusione

- I prescrittori dell'infermiera sono globalmente più giovani
- Il sostegno, l'incoraggiamento degli attori e l'ambiente, essendo stato informato dalla direzione dell'infermiera e dall'OIIQ sono associati al possesso del certificato
- Maggiore prevalenza dell'attestazione nei servizi di assistenza sanitaria di base pubblici
- Maggiore prevalenza di prescrizione nelle cliniche mediche (maggiore autonomia dell'infermiera che non è collegata con la Direzione Infermieristica)
- Motivi della certificazione: personale e professionale
- Motivo per non attestare: organizzativa
- Sicurezza nelle loro competenze

Domanda ?

roxane.borges.da.silva@umontreal.ca

isabelle.brault@umontreal.ca



Ordre
des infirmières
et infirmiers
du Québec

INSTITUT DE RECHERCHE
EN SANTÉ PUBLIQUE



Université 
de Montréal

Faculté des sciences infirmières

Université 
de Montréal et du monde.

Fonds de recherche
Santé

Québec 